

54ème Congrès de la Société Européenne de Phlébectomie

Le 54ème Congrès de la société Européenne de Phlébectomie s'est tenu le 1^{er} octobre 2016 à Bucarest, dans le cadre prestigieux du Théâtre Elisabeta, organisé par le Pr Marina Pacescu en collaboration avec la Société Roumaine de Phlébectomie.

Après une introduction du **Dr PL Choukroun et du Pr M.Pacescu**, différentes communications sur le diagnostic et le traitement de la maladie veineuse chronique ont été présentées.

T Feodor a parlé d'une classification des reflux échodoppler de la jonction saphéno-fémorale distinguant les reflux terminaux des reflux pré-terminaux en identifiant les autres sources de reflux telles que le contingent inguino-abdominal et les réseaux dystrophiques lympho-ganglionnaires.

Un cas clinique historique (1^{ère} incursion chirurgicale à l'intérieur du corps humain) - tumeur géante de l'ovaire opérée aux Etats Unis au XIX^{ème} siècle a été présenté par **PL Choukroun**.

Deux communications ont été présentées par **F. Vin et C. Lebard** sur l'évolution du traitement des saphènes par procédure thermique Laser et Radiofréquence et leurs résultats à long terme. Dans le traitement des petites veines saphènes, un repérage échographique des nerfs Ischiatique et sural par écho-marquage permet de réduire les risques de complications nerveuses à type de dysesthésies.

Le **Pr Coriu** a parlé des Thrombophilies découvertes au cours d'épisodes de maladie thrombo-embolique veineuse (MTEV). Sur une série de 173 patients ayant eu un épisode de MTEV documenté, il ne retrouve une thrombophilie que dans 45% des cas. Il donne les indications de la période à laquelle doit être prélevé le patient en fonction du type de test et du traitement anticoagulant.

R. Benoit et JF. Luthi ont précisé les limites et les indications du traitement en cas d'artériopathie des membres inférieurs.

Le problème de l'association entre maladie veineuse et hémoroïdes a été évoqué par **ST Jianu**. L'étude a été réalisée auprès de médecins généralistes et spécialistes. Les résultats montrent que 29,33% des patients qui consultaient, étaient porteurs d'hémorroïdes.

42,3% de patients avec hémorroïdes avaient des antécédents familiaux de MVC.

D Heim a rappelé que les récides variqueuses post-opératoires sont fréquentes et que le traitement peut être la sclérothérapie à la mousse en cas de cavernome, de procédure thermique en cas de récide tronculaire ou de crossectomie en cas d'ectasie.

V. Ciubotaru a montré la fréquente association entre gonarthrose et maladie veineuse (18% à 48%) avec une amélioration des douleurs articulaires dans 84% des cas après traitement des varices.

M. Salagean a fait une présentation complète sur l'embolie pulmonaire, son diagnostic et son traitement.

Deux communications de **C. Buga et C. Panaite** ont porté sur l'association de la maladie veineuse chez le diabétique, en association avec une artériopathie.

La réunion avec médecins et chirurgiens Roumains a été très conviviale et les discussions très interactives. Nous renouvelons nos remerciements à notre amie Marina Pacescu et son équipe.

Frédéric Vin

Président d'Honneur de la Société Française de Phlébologie